

PANDEMİNİN TÜRKİYE'DEKİ MERKEZ ÜSSÜ İSTANBUL'DA SON DURUM;

HASTANELER DOLUYOR, SAĞLIK ÇALIŞANLARI TÜKENİYOR.

COVID-19 pandemisinin ikinci yılını doldurmak üzere olduğumuz şu günlerde, Omicron varyantının oluşturduğu yeni dalga adeta bir tsunami gibi tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına almıştır. Gerek Omicron varyantının artmış bulaşıcılık özelliği, gerek kısıtlamaların azaltılması, gerekse de kuzey yarım kürede kış döneminin etkisiyle ülkemizde ve dünya genelinde olgu sayılarında yeniden artış gözleniyor. Birçok ülkede günlük vaka sayıları rekor üstüne rekor kırarken; Türkiye'de resmî verilere göre test kısıtlamasına rağmen günlük vaka sayısı üç haftadır 60 binin üzerinde, test pozitiflik oranı da vaka sayılarına paralel biçimde bir haftadır %15'in üzerinde seyretmektedir. Yine resmi verilere göre her gün 150-200 arasında yani bir uçak dolusu insanımızı kaybediyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da itiraf ettiği gibi İstanbul haftalardır pandeminin merkez üssü haline gelmiş durumda. Haftalık vaka sayısı pandeminin başından itibaren en yüksek sayıya ulaşan İstanbul'da yüz binde 1571 olarak açıklandı. Hastanelerde Covid servisleri ve yoğun bakımlar doluyor. Yenileri açılıyor. Meslektaşlarımız artan iş ve hastalık yükü yanında, güvensiz çalışma ortamı nedeniyle tükeniyor. Sağlık çalışanları korunmaktan öte hasta hasta çalışmak zorunda kalıyor. En başından beri kontrol edilemeyen salgın neredeyse kendi doğal seyrine bırakılmış durumda yayılmaya ve öldürmeye devam ediyor. Semptomu olmayan temaslılara test yapılmaması, izolasyon ve karantinanın tamamen kaldırılması veya sürelerinin kısaltılması, aşısız veya eksik aşıli kişilerin test yaptırmadan kapalı alanlara girişi ve seyahati ile kısıtlamaların kaldırılması hastalığın yayılmasını hızlandırıyor. Yarıyıl tatili için yurdun dört bir yanına yayılan İstanbulluların hastalığın daha da yayılmasına yol açması beklenmelidir. Herkesin hastalığı geçirmesi sonucu toplumsal bağışıklık kazanılacağı beklentisinin bedeli daha fazla insanın ölümü olacaktır.

Omicron varyantının bir önceki Delta varyantına göre daha hafif atlatıldığı yönünde veriler mevcut olsa da özellikle hastalığı geçirmeyen, aşısız ve hatırlatma dozu yapılmayanlar dâhil eksik aşıllılarda oldukça ölümcül olabildiğini gösteren çalışmalar da bulunmaktadır. Bunun yanında Delta varyantı halen dolaşımdadır. Kronik hastalığı bulunan veya ileri yaşlardaki kişilerin hem Delta hem de Omicron varyantına karşı kırılgan olduğu, aşının %100 koruyucu olmadığı bilinmektedir. Diğer kişiler hastalığı hafif geçirse bile hastalığı daha ağır geçiren daha fazla hastaneye yatan, daha fazla ölen bu dezavantajlı gruptaki kişilere bulaşmasına neden olmaktadır.

Omicron sürecinde sađlık alıřanlarının korunması ile ilgili nerdiđimiz dzenlemeler řunlardır:

- Sađlık alıřanı lmlerinde de ařısız ve eksik ařılı sađlık alıřanları gze arpmaktadır. Yasal dzenlemeler de kullanılarak tm sađlık alıřanlarının COVID-19'a karřı zorunlu olarak tam ařılı olması sađlanmalıdır.
- Riskli alanlarda alıřan sađlık alıřanlarına FFP2, FFP3, N95 benzeri ve zeri koruyuculuđu olan maskeler parasız řekilde sađlanmalıdır.
- Atama bekleyen, ataması yapılmayan, kamu grevine hukuksuzca son verilen sađlık alıřanlarının ataması derhal yapılmalıdır.
- Bađıřıklık yetmezliđi, kronik hastalık gibi riskli durumları olan sađlık alıřanlarına risk durumuna gre kış ayları boyunca cretli izin verilmelidir.
- İzolasyondaki sađlık alıřanlarından yedinci gnn sonunda halen hastalık belirtisi olanlarda izolasyon uzatılmalıdır (10 gn). Eđer kiřinin belirtisi yoksa, mevcut izolasyon kuralları uygulanmalıdır (5. gn PCR negatifse veya 7. gn iře dnř).

Toplum iin nerilerimiz

- Vakaların saptanabilmesi iin PCR testi yanında hızlı antijen testi yaygın olarak kullanılmalıdır.
- Hızlı antijen testi ve PCR testi ile saptanan vakaların ařı durumları gz nne alınarak testi negatifleřenlerde 5 gn, hastalık belirtileri olanlarda 10 gne kadar izolasyon uygulanmalıdır.
- Kapalı ve kalabalık ortamlarda alıřanlar iin ařı zorunluluđu getirilmelidir.
- Ařı kartı uygulaması ile ařısız veya eksik ařılıların kalabalık ortamlara giriřine izin verilmemelidir.
- 5-11 yař arası ocuklar iin ařılama bařlatılmalıdır.
- Bađıřıklık yetmezliđi, kronik hastalık gibi riskli durumları olan tm alıřanlara risk durumuna gre kış ayları boyunca cretli izin verilmelidir.
- Maske kullanılması, zorunlu olmadıka kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunulmaması, kapalı alanların havalandırılması sađlanmalıdır.

İSTANBUL TABİP ODASI YNETİM KURULU